



免疫チェックポイント阻害薬 副作用確認シート



氏名：

月/日：

使用ICI名：

投与中 / 治療経験あり

すぐに病院に連絡すべき症状

重症筋無力症・筋炎

- ☐ まぶたが下がる
- ☐ 物が二重に見える
- ☐ 筋肉痛がある

心筋炎

- ☐ 息苦しい
- ☐ 浮腫や体重増加がある
- ☐ 動悸がする

1型糖尿病

- ☐ 喉がひどく渇く
- ☐ 水を多く飲む
- ☐ 尿量が増える

間質性肺炎

- ☐ 息苦しい
- ☐ 咳が増えた
- ☐ 37.5℃以上の発熱

大腸炎・下痢

- ☐ 下痢
- ☐ 便に血が混じる



次回受診時に相談すべき症状

内分泌障害

- ☐ 体がだるい
- ☐ 食欲が落ちる
- ☐ 吐き気がある

静脈血栓症

- ☐ 浮腫や腫れがある

皮膚障害

- ☐ 発疹がある
- ☐ 皮膚に痒みがある

神経障害

- ☐ 手足の痺れがある
- ☐ 力の入りにくさがある

※ここに記載されている以外の症状が出現することがあります

症状 \ グレード	0	1	2	3
呼吸困難	なし	階段や坂道を上る際に息切れがある	ゆっくり歩行した際に息切れはあるが日常生活は出来る	息切れにより身の回りのことも出来ない
浮腫		夕方に浮腫がある	朝も改善しない浮腫がある	急激な浮腫と体重増加があり身の回りのこともできない
倦怠感		動くのだるいが休むと回復する	常時だるさがあるが日常生活は出来る	だるさのため日常生活が出来ない
食欲不振		食欲低下を感じるが食事量は変わらない	食欲低下を感じ、食事量が減った	経腸静脈栄養を要する
皮疹		体表面積の10%未満	体表面積の10～30%	体表面積の30%以上
下痢		普段と比べ1日1～3回下痢が増えた	普段と比べ1日4～6回下痢が増えた	普段と比べ1日に7回以上下痢が増えた
痺れ(部位：)		手足に違和感がある	痺れを感じるが日常生活は出来る	痺れのため身の回りのことも出来ない
筋力低下(部位：)		明らかな筋力低下はないが力の入りにくさを感じる	筋力低下はあるが日常生活は出来る	明らかな筋力低下のため身の回りのことも出来ない
その他の症状				